


# វិធីការពារផ្សេងៗទៀត

វិធីបង្កប់ប្រដាប់ការពារក្នុងស្បូន ៖ របៀបទាំងនេះត្រូវបានដាក់នៅខាងក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រី ដើម្បីរក្សាពងពូជស្ត្រី និងមេជីវិតនៃទឹកកាមបុរស កុំឲ្យជួបគ្នាបាន ។

**អែយូឌី (សំរាប់ស្ត្រី)** ៖ ពាក្យ IUD (អែយូឌី) គឺជាពាក្យកាត់នៃពាក្យ "intrauterine device" មានន័យថា ប្រដាប់សំរាប់ដាក់ក្នុងស្បូន ។ អែយូឌីជាប្រដាប់មួយតូចធ្វើពីដែក ដែលដាក់ចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រី ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យ ។ អែយូឌីមានពីរប្រភេទ ។ មួយមានជាតិទងដែក ហើយមួយទៀតមានជាតិហ្វូស៊ីត ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានគភ៌ ។ អែយូឌីអាចទុកនៅក្នុងស្បូនបានចំនួនពី 3-10 ឆ្នាំ អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនីមួយៗ ។



**វិធីការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍** ៖ វិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពអស់មួយជីវិតរបស់អ្នក ។ វិធីនេះសំរាប់មនុស្សដែលពិតជាលែងចង់ឲ្យមានកូនទៀត នៅពេលអនាគត ។

**ការចងដៃស្បូន និង Essure® (សំរាប់ស្ត្រី)** ៖ ការចងដៃស្បូន (ការចងដៃស្បូនរបស់អ្នក) និង Essure® (អេសស៊ុរ) គឺជាទម្រង់ការវះកាត់ពីរប្រភេទខុសគ្នា សំរាប់ធ្វើឲ្យស្បូនទងដៃស្បូនរបស់ស្ត្រី ដើម្បីស្ងាត់ពងពូជស្ត្រី កុំឲ្យជួបនឹងមេជីវិតនៃទឹកកាមបុរស ។ ទម្រង់ការវះកាត់នេះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ។

**ការវះកាត់បំពង់ទឹកកាម (សំរាប់បុរស)** ៖ ការវះកាត់បំពង់ទឹកកាមគឺជាការវះកាត់ម្យ៉ាង ដែលធ្វើដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ។ បំពង់ទឹកកាមបុរសដែលផ្ទុកមេជីវិត ត្រូវបានកាត់ចេញ ឬធ្វើឲ្យស្ងួត ម៉្លោះហើយមេជីវិតមិនអាចចេញរួចបានទេ នៅពេលបុរសបញ្ចេញទឹកកាម នៅពេលរួមដំណេក ។

**វិធីប្រព្រឹត្តតាមកិរិយា** ៖ ដៃគូត្រូវតែពិគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ទើបវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតបាន ។

**តំណាម (សំរាប់ស្ត្រី និងបុរស)** ៖ តំណាមមានន័យថា ការគម្ពគ់មានការរួមដំណេកនៅពេលណាមួយឡើយ ។ មនុស្សមួយចំនួនគិតថា ការគម្ពគ់រួមដំណេកគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានគភ៌ ។ បើសិនជាបានអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវ តំណាមមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ ក្នុងការការពារកុំឲ្យមានគភ៌ ការពាររោគអេចអាយវី និងការពារកាមរោគផ្សេងៗទៀត ។

**គំរោងគ្រួសារជាធម្មជាតិ (សំរាប់ស្ត្រី និងបុរស)** ៖ វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យអាចបង្រៀនអ្នក ឲ្យយល់អំពីការផ្លាស់ប្តូររូងរាល់ខែនៃដំណើរមានរដូវរបស់អ្នក ម៉្លោះហើយអ្នកអាចទាយថាថ្ងៃណាមួយដែលអ្នកទំនងនឹងមានគភ៌ ។ បន្ទាប់មក អ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកអាចការពារកុំឲ្យមានគភ៌បាន ដោយប្រើរបៀបការពារកុំឲ្យមានកូន ឬដោយមិនរួមដំណេក នៅថ្ងៃដែលអ្នកដឹងថាទំនងនឹងមានគភ៌ ។



**ខួបអង្កាំ (សំរាប់ស្ត្រី)** ៖ ខួបអង្កាំគឺជាខ្សែអង្កាំមានពណ៌ ដែលអ្នកអាចប្រើ ដើម្បីចំណាំថ្ងៃណាមួយ ដែលអ្នកដឹងថាទំនងនឹងមានគភ៌ បើសិនជាអ្នករួមដំណេក ។ អ្នករកិលក្រវិលជុំវិញអង្កាំមួយ ជារូងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីរាប់ថ្ងៃនៃខួបរដូវរបស់អ្នក ។ នៅថ្ងៃដែលអ្នកដឹងថាទំនងនឹងមានគភ៌ អ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកមិនត្រូវរួមដំណេកសោះឡើយ ឬត្រូវតែប្រើរបៀបការពារដើម្បីកុំឲ្យមានគភ៌ ។

**ជំងឺសផ្សេងៗទៀត** ៖ ចូរពិគ្រោះជាមួយនិងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពីរបៀប និងនៅពេលបំបៅដោះកូន ព្រមទាំងការដកលិង្គដែលអាចបន្ថយឱកាសរបស់អ្នកនៃការមានគភ៌ ។ កាលបើបានប្រើដោយត្រឹមត្រូវ ជំងឺសទាំងនេះអាចជួយការពារកុំឲ្យមានគភ៌បាន ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុត នៅពេលណាបានប្រើជុំវិញជាមួយនិងរបៀបមួយផ្សេងទៀត ។

ដើម្បីការពាររោគអេចអាយវី (HIV) និងកាមរោគ (STD) ផ្សេងៗទៀត អ្នកត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យស្រោមអនាម័យកៅស៊ូឬជ័រ គឺជាប្រភេទតែម្យ៉ាងគត់នៃការការពារកុំឲ្យមានកូនដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារនូវរោគអេចអាយវី និងកាមរោគផ្សេងៗទៀតផងដែរ ។ បើអ្នកប្រើវិធីការពារកុំឲ្យមានកូនតាមប្រភេទផ្សេងទៀត ហើយអ្នកក៏ចង់ការពារប្រឆាំងរោគអេចអាយវី និងកាមរោគ អ្នកត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យជាបន្ថែមទៅលើវិធីការពារ ដែលអ្នកកំពុងតែប្រើផងដែរ ។

**វិធីការពារកុំឲ្យមានកូន បន្ទាប់ពីមានទារក** បើអ្នកទើបតែមានកូនខ្លី ឬកំពុងបំបៅដោះកូន អ្នកគួរតែប្រើវិធីការពារកុំឲ្យមានកូនដើម្បីការពារកុំឲ្យមានគភ៌ ។ សូមសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពីវិធីការពារកុំឲ្យមានកូនប្រភេទណាមួយ ដែលអ្នកអាចប្រើមានប្រយោជន៍កុំឲ្យអ្នកមានគភ៌ទៀត រហូតថាដល់ពេលអ្នកចង់ឲ្យមានថ្មីពោះ ។

**វិធីការពារកុំឲ្យមានកូនជាបន្ទាន់** វិធីការពារកុំឲ្យមានកូនជាបន្ទាន់អាចការពារកុំឲ្យមានគភ៌ បន្ទាប់ពីបានរួមដំណេកប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកប្រើវាយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត - ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ ។ បើអ្នកបានរួមដំណេកដោយឥតប្រើវិធីការពារ (រួមដំណេកឥតប្រើវិធីការពារកុំឲ្យមានកូន) ដោយសារត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរួមដំណេក ឬបើអ្នកគិតថា វិធីការពារកុំឲ្យមានកូនដែលអ្នកបានប្រើមុនមានប្រសិទ្ធភាពទេ អ្នកអាចប្រើវិធីការពារកុំឲ្យមានកូនជាបន្ទាន់នេះបាន ។